

UN COMPROMISO CON UNA SONRISA SANA Y HERMOSA



asociarse para obtener resultados óptimos para los pacientes



Su Socio Leal de Salud 24/7



UN COMPROMISO CON UNA, SONRISA SANA Y HERMOSA

La comunicación abierta entre los dentistas y los pacientes con trastornos hemorrágicos es crucial para garantizar una salud bucal adecuada. Por favor, hable sobre su condición, historial médico y cualquier medicamento con la oficina antes de su llegada. Si se siente incómodo de alguna manera, pídale al dentista que le llame.

Los dentistas son una parte importante de su equipo médico y deben estar equipados para cualquier cosa. Al proporcionar su historial médico, su dentista puede personalizar sus planes de tratamiento para que se adapten a sus necesidades y tomar las precauciones necesarias para minimizar los riesgos de sangrado.

Su nivel de comodidad con la práctica y su equipo es de suma importancia. Haga preguntas y comparta cualquier inquietud. Comprenda sus opciones de tratamiento, medidas preventivas y técnicas de higiene bucal. Esto le permite tomar un papel activo en el mantenimiento de su salud bucal.

INFORMACIÓN QUE LA CLÍNICA DENTAL DEBE CONOCER

- Al programar la cita, asegúrese de que sepan el tipo y la gravedad de su trastorno hemorrágico.
- Describa los medicamentos que está tomando.
- Comparta cualquier medicamento preventivo.
- Explique si trata los sangrados previamente con factor, acetato de desmopresina, aerosol nasal, ácido tranexámico o Amicar. El aerosol nasal de acetato de desmopresina no funcionará si usted tiene hemofilia B.
- Comparta la información de contacto de su hematólogo.
- También infórmele al dentista si tiene uno de los siguientes:
 - un inhibidor
 - una enfermedad infecciosa
 - reemplazo de articulaciones
 - dispositivo de acceso venoso (catéter)

IMPORTANCIA DE UNA BUENA SALUD BUCODENTAL

No es inusual descuidar sus dientes o ir al dentista porque teme sangrar. Con el tiempo, la negligencia conducirá a problemas más grandes, como gingivitis, periodontitis y caries.

¿Sangran sus encías al cepillarse o usar hilo dental? Podría tener gingivitis. No se preocupe; se puede revertir con tratamiento dental y un buen cuidado oral en casa.

Si las encías están hinchadas durante mucho tiempo, se pueden formar bolsas entre el diente y la encía. El sarro, la placa y las bacterias pueden formarse y causar una infección grave y posiblemente la pérdida de dientes.

nuestros
expertos
están listos
para colaborar
con usted las
24 horas del día,
los 365 días del año



CONSEJOS PARA LA SALUD DENTAL

LA PREVENCIÓN ES EL MEJOR TRATAMIENTO

Le recomendamos que realice lo siguiente:

- Cepíllese los dientes con pasta dental con flúor durante al menos 2 minutos dos veces al día con un cepillo de dientes de textura media.
- Use hilo dental al menos una vez al día.
- Evite hábitos que puedan causar lesiones en la boca o fracturas dentales.
- Evite masticar alimentos duros y pegajosos.
- Realice revisiones dentales periódicas cada 6-12 meses.
- Limite los alimentos y bebidas azucarados.
- Si fuma, tiene la boca seca o toma ciertos medicamentos, es posible que deba someterse a una limpieza profesional con más frecuencia.

SÍNTOMAS IMPORTANTES A OBSERVAR

- Encías inflamadas o hinchadas.
- Encías que sangran con facilidad.
- Dolor al masticar.
- Cepillo de dientes de color rosa después del cepillado.
- Desarrollo de un nuevo espacio entre los dientes.

QUÉ HACER SI EL SANGRADO DE LAS ENCÍAS NO SE DETIENE

Si tiene que programar algún tipo de extracción, es importante que se lo comunique a su farmacéutico. Es posible que su médico le recete Amicar o ácido tranexámico.

Incluso después de tomar ácido tranexámico o Amicar, algunos pacientes pueden experimentar sangrado repetido. Es importante que se comunique con su dentista o hematólogo de inmediato. Es posible que quieran que use el factor para ayudar. Es posible que quieran que use Amicar o ácido tranexámico por vía tópica como alternativa.

Si su dentista y hematólogo le indican que use factor y el sangrado se detiene, pero luego se reanuda de 2 a 3 días después, comuníquese con ellos de inmediato. Solo coma alimentos fríos y blandos después de un procedimiento dental para reducir la posibilidad de sangrado adicional.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS MEDICAMENTOS

MEDICAMENTOS QUE PUEDEN CAUSAR AGRANDAMIENTO DEL TEJIDO DE LAS ENCÍAS:

ANTICONVULSIVOS

Depakote, Fenitoína, Primidona, Zarontín

INMUNOSUPRESORES

Ciclosporina, Sirolimús

MEDICAMENTOS PARA LA PRESIÓN ARTERIAL Amlodipino, Diltiazem, Felodipino, Verapamilo

MEDICAMENTOS QUE PUEDEN CAUSAR SEQUEDAD EN LA BOCA:

ANTIDEPRESIVOS

Wellbutrin, Lexapro, Zoloft

DESCONGESTIONANTES

Familafrina Basuda afadrin

Fenilefrina, Pseudoefedrina

CIERTOS ANTIHISTAMÍNICOS Benadryl, difenhidramina, cloro-trimetón, etc.

CIERTOS MEDICAMENTOS PARA LA PRESIÓN ARTERIAL Diuréticos (HCTZ, Furosemida, Torasemida)



PÉRDIDA DE DIENTES DE LECHE

Es importante que los dientes de leche se caigan solos. No jale el diente. Extraer un diente flojo antes de que esté listo puede irritar las encías, causar sangrado y lesionar el alvéolo del diente.



Consejos para la pérdida de dientes de leche:

- Enrolle una gasa de algodón o utilice una bolsita de té húmeda y colóquela donde estaba el diente. Asegúrese de que el niño muerda la gasa. Aplique presión durante varios minutos.
- No enjuague la boca de su hijo.
- Deje que el niño coma alimentos blandos solo durante un par de días.
- Si el sangrado dura más de 2 horas, consulte a su hematólogo

DOLOR CON PROCEDIMIENTOS DENTALES

Es posible que los dentistas le recomienden que tome Tylenol (acetaminofén) o Celebrex (celacoxib). Si no tiene problemas cardiovasculares, Celebrex puede ayudar con el dolor y la inflamación. Tylenol ayuda solo con el dolor.

El ibuprofeno, el naproxeno, la aspirina y la mayoría de los demás **AINE generalmente NO** se recomiendan para pacientes con trastornos hemorrágicos. Pueden inhibir la función plaquetaria y empeorar el sangrado. Si su dentista le receta alguno de estos medicamentos, consulte con su hematólogo antes de tomarlos.

Si su dolor no se controla dentro de los 10 días, debe hacer un seguimiento con el dentista para asegurarse de que no tenga una infección.

SIEMPRE ALTERNE SU FACTOR

Cuando reciba un nuevo envío de factor, asegúrese de tomar nota de su factor PRN. Si se acerca la fecha de vencimiento, use ese medicamento primero antes de que caduque. Siempre mire la fecha de vencimiento antes de usar su medicamento.

Si tiene factor caducado, NO LO USE. Llame a su farmacia para una disposición adecuada. Si usa factor vencido, es posible que no reciba el efecto completo de la dosis y que no lleve su nivel de factor al rango deseado. Llame a su farmacéutico para que trabaje con su médico y le proporcione un factor que no esté vencido.



PAUTAS DENTALES GENERALES

¿QUÉ PUEDE REALIZAR UN DENTISTA SIN CONSULTAR A UN HEMATÓLOGO?

- Examen
 - Radiografía
 - Restauración
 - · Aplicación de flúor
 - Creación de impresiones

CONSIDERE CONSULTAR A UN HEMATÓLOGO

- Tratamiento de ortodoncia
- Tratamiento de pulpa
 - Corona de acero inoxidable
 - Pinza de goma

CUÁNDO PARAR Y CONSULTAR A UN HEMATÓLOGO

- Bloqueo dental interior
- Anestesia local lingual
- Cirugía oral
- Desbridamiento de raíces

Cirugía periodontal

• Colocación de implantes

 Extracción de dientes

Conozca cómo los servicios de Fidelis Specialty Pharmacy ayudan a los pacientes con hemofilia a vivir su mejor vida.





fide is specialty pharmacy
Su Socio Leal de Salud 24/7



www.fidelis-rx.com CA 866.643.2042 NV 866.643.3547